

(1) לשון

- א. איבוד פחות ממחצית הלשון -
- I. ללא השפעה בולטת על הדיבור והבליעה 10%
 - II. עם השפעה בולטת על הדיבור והבליעה 20%
- ב. איבוד מחצית הלשון או יותר מכן -
- I. ללא איבוד מוחלט של הדיבור והבליעה 40%
 - II. עם איבוד מוחלט של הדיבור והפרעה ניכרת בבליעה 60%

(2) ושט

- א. מיצר Stricture של הושט -
- I. בצורה בינונית 30%
 - II. בצורה קשה 50%
 - III. בצורה קשה מאוד, המאפשרת רק שתיית נוזלים, מצב כללי ירוד מאד 80%
- ב. סעיפי הושט (Diverticulum) -
- I. ללא הפרעות או עם הפרעות קלות 1%
 - II. הפרעות בינוניות 10%
 - III. הפרעות קשות 30%
- ג. אזופגיטיס (Esophagitis) -
- I. בצורה קלה 10%
 - II. בצורה בינונית 30%
 - III. בצורה קשה עם שטפי-דם חוזרים, אנמיה בולטת 50%
- ד. קרדיוספזמוס (Cardiospasm) -
- I. אחוזי הנכות ייקבעו בהתאם למצב הכללי ולדרגת היצרות של הושט
 - II. לאחר ניתוח, הפרעות מזעריות 1%
 - III. לאחר ניתוח, קיימות הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן ג.
- ה. בקע סרעפתי (Hernia diaphragmatica) -
- א. אחוזי הנכות ייקבעו לפי המצב של הושט בהתאם לסעיף קטן ג.
 - ב. בקע סרעפתי לאחר ניתוח
 - I. אין הפרעות 1%
 - II. קיימות הפרעות, אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף קטן ג.

(3) קיבה

- א. דלקת כרונית של הקיבה -
- I. בצורה קלה ללא הפרעות 1%
 - II. בצורה בינונית: המצב הכללי והתזונתי משביע רצון 10%
 - III. בצורה ניכרת, עם השפעה על המצב הכללי 30%
- ב. כיב הקיבה או כיב התריסריון
- I. כיב שהתרפא, אין הפרעות 1%

- 10% II. בצורה קלה, התקפים קצרים ונדירים
- 30% III. בצורה בינונית (התקפים חוזרים, ממושכים יותר)
- IV. בצורה קשה עם סיבוכים כגון: שטפי-דם, היצרות השוער,
60% השפעה ניכרת על המצב הכללי
- ג. כיב הקיבה או כיב התריסריון לאחר ניתוח - אחוזי הנכות ייקבעו לפי סעיף
.14