

51. (1) פציעת קבוצת השרירים

		Pyriiformis, Gamellus, Obturator, Quadratus fem.
10%	א.	בצורה בינונית
20%	ב.	בצורה ניכרת
30%	ג.	בצורה קשה
		Gluteus maximus, Medius, Minimus (2)
20%	א.	בצורה בינונית
30%	ב.	בצורה ניכרת
50%	ג.	בצורה קשה
		Ilio-psoas Pectineus (3)
20%	א.	בצורה בינונית
20%	ב.	בצורה ניכרת
30%	ג.	בצורה קשה
		Adductor longus, Brevis, Magnus, Gracilis (4)
10%	א.	בצורה בינונית
20%	ב.	בצורה ניכרת
30%	ג.	בצורה קשה
		Sartorius, Rectus femoris, Vastus externus, intermedius-internus, tensor fasciae latae (5)
10%	א.	בצורה בינונית
20%	ב.	בצורה ניכרת
30%	ג.	בצורה קשה
		Semitendinosus Biceps femoris, Semi-membranosus (6)
10%	א.	בצורה בינונית
20%	ב.	בצורה ניכרת
30%	ג.	בצורה קשה
		Tibialis anterior, Extensor digit. longus, Peroneus tertius (7)
10%	א.	בצורה בינונית
10%	ב.	בצורה ניכרת
20%	ג.	בצורה קשה
		Ttriceps surae, Tibialis posterior, Peroneus longus, Flexor hallucis longus, Flexor digit., Longus, Popliteus (8)
10%	א.	בצורה בינונית
20%	ב.	בצורה ניכרת
20%	ג.	בצורה קשה
		Extensor hallucis brevis, Extensor digit. brevis, Interossei (9)
10%	א.	בצורה בינונית
10%	ב.	בצורה ניכרת

20%	ג. בצורה קשה
	Flexor digit. brevis, Abductor hallucis, Quadratus plantae, Adductor hallucis, Flexor (10) hallucis
10%	א. בצורה בינונית
20%	ב. בצורה ניכרת
30%	ג. בצורה קשה