

13. (1) פציעת שרירי הכתף

שמצל	ימין	
		א. Trapezius, Serratus magnus, Levator scapulae
10%	10%	I. בצורה בינונית
10%	20%	II. בצורה ניכרת
20%	30%	III. בצורה קשה
		ב. Pectoralis major, Minor, Latissimus dorsi, Teres major
10%	10%	I. בצורה בינונית
20%	20%	II. בצורה ניכרת
30%	30%	III. בצורה קשה
		ג. Deltoideus
10%	20%	I. בצורה בינונית
20%	30%	II. בצורה ניכרת
30%	40%	III. בצורה קשה
		ד. Supraspinatus, Infraspinatus, Subscapularis, Coracobrachialis
10%	10%	I. בצורה בינונית
10%	20%	II. בצורה ניכרת
20%	30%	III. בצורה קשה

(2) פציעת שרירי המרפק

		א. Biceps, Brachialis, Brachioradialis
10%	10%	I. בצורה בינונית
20%	20%	II. בצורה ניכרת
30%	30%	III. בצורה קשה
		ב. Triceps, anconeus
10%	10%	I. בצורה בינונית
20%	20%	II. בצורה ניכרת
30%	30%	III. בצורה קשה
		ג. Flexor carpi, digiti
10%	10%	I. בצורה בינונית
10%	20%	II. בצורה ניכרת
20%	30%	III. בצורה קשה
		ד. Extensor carpi, digiti
10%	10%	I. בצורה בינונית
10%	10%	II. בצורה ניכרת
10%	20%	III. בצורה קשה