

- (1) הפרעה בסבילות לפחמימות Impaired Glucose Tolerance 1%
- (2) סוכרת המטופלת על ידי דיאטה בלבד 5%
- (3) סוכרת המטופלת על ידי דיאטה וכדורים 10%
- (4) סוכרת יציבה המאוזנת בצורה סבירה על ידי טיפול בדיאטה וזריקות אינסולין 20%
- (5) א. סוכרת המטופלת על ידי דיאטה וזריקות אינסולין אך מצטיינת בחוסר יציבות וצורך מוגבר בניטור עצמי
ב. סוכרת "שבירה" (Brittle) או סוכרת המטופלת על ידי משאבת אינסולין
- ג. סוכרת הריונית - מטופלת בזריקות אינסולין בזמן ההריון בלבד 40%
- (6) סוכרת אשר הופיעו בה אחד או יותר מן הסיבוכים הבאים (ללא קשר לצורת הטיפול):
- א. נזירופתיה סימפטומטית (תחושתית - מוטורית או אוטונומית);
- ב. רטינופתיה סוכרתית (של הרקע - BDR, או משגשגת - PDR);
- ג. פרוטאינוריה קבועה, או הוכחה היסטולוגית לנפרופתיה סוכרתית;
- ד. מחלת כלי דם הקפיים;
- ה. מחלת כלי דם כלילים 65%
- לא תיקבע נכות נפרדת לסיבוכים האמורים כל עוד החומרה של פגימה נפרדת הנובעת מהם לא עולה מעל 30%; עלתה על 30% - יש לקבוע נכות נפרדת נוספת בהתאם למבחנים ספציפיים.
- (7) כמו בפרט משנה (6) אך עם שלושה סיבוכים לפחות שכל אחד מהם בחומרה של 30% ומעלה 100%